



101 Manning Drive
Chapel Hill, NC 27514

T 984.974.9950
Gratis 1.888.263.5293
F 984.974.0888

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA DONANTE VIVO DE UNC TRANSPLANT
UNC TRANSPLANT LIVING DONOR CRITERIA SCREEN

1. Las contraindicaciones absolutas para la donación de riñón de donante vivo pueden incluir, entre otras:
 - a. Diabetes
 - b. Poliquistosis renal
 - c. Artritis reumatoide
 - d. Lupus
 - e. Menor de 18 años o todavía en la secundaria
 - f. Hipertensión no controlada
 - g. Cáncer activo o cáncer tratado de modo incompleto, excluido el cáncer de piel distinto del melanoma
 - h. Alta sospecha de coacción de donantes
 - i. Alta sospecha de intercambio financiero ilegal entre donante y receptor
 - j. Trastorno de consumo de drogas en la actualidad
 - k. Signo de infección sintomática aguda (hasta que se resuelva)
 - l. Uso actual de cigarrillos/nicotina
 - m. Indicio actual de tendencias suicidas
 - n. Antecedentes de trastorno de coagulación.
 - o. Anemia drepanocítica o rasgo drepanocítico
 - p. Dos alelos de riesgo APO-L1
 - q. Trastorno psicótico activo o bipolar 1
2. Contraindicaciones relativas (para evaluar individualmente):
 - a. Índice de masa corporal (IMC) mayor de 30
 - b. Hipertensión (se considera la edad del donante, la duración de la hipertensión y el régimen de medicación)
 - c. Antecedentes de cáncer con probabilidad considerable de recurrencia.
 - d. Cálculos renales
 - e. Trastorno bipolar 2
 - f. Otras preocupaciones médicas o psicosociales que representan un riesgo excesivo para el donante o el receptor